

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE

20 mg/g + 1 mg/g sciroppo

POTASSIO SOLFOQUAIACOLATO + DESTROMETORFANO BROMIDRATO

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE
3. Come usare CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE e a che cosa serve

CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE contiene destrometorfano bromidrato, che calma la tosse secca riducendone sia l'intensità che la frequenza (azione antitussiva), e potassio solfoquaiacolato, che aumenta la secrezione e l'eliminazione del catarro (azione espettorante).

Questo medicinale si usa nel trattamento dei sintomi della tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE

Non usi CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di asma.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE:

- se ha la pressione sanguigna (arteriosa) alta;
- se soffre di problemi al cuore (insufficienza cardiaca);
- se ha problemi alla tiroide (tireotossicosi).

Bambini

Usi questo medicinale nei bambini sotto i 2 anni di età solo se il pediatra lo ha ritenuto necessario e sotto il suo controllo.

Altri medicinali e CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare **deve evitare** di prendere questo medicinale se sta prendendo antidepressivi (medicinali contro la depressione) o se ha smesso di prenderli da meno di due settimane.

CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE con alcol

È consigliabile non bere alcol durante il trattamento con questo medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in gravidanza o sta allattando al seno, usi questo medicinale solo se il medico lo ha ritenuto necessario e sotto il suo controllo.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale può causare sonnolenza. Non deve guidare, utilizzare macchinari complessi o svolgere qualsiasi altra attività potenzialmente pericolosa fino a quando non saprà se questo medicinale altera la sua capacità di svolgere queste attività.

CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE contiene:

- **saccarosio:** se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. Questo medicinale contiene 6,8 g di saccarosio per dose (2 misurini = 20 ml). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.
- **etanolo:** Questo medicinale contiene 6,25 vol % etanolo (alcool), ad es. fino a 1,13 g per dose, equivalenti a 28,3 ml di birra, 11,8 ml di vino per dose (2 misurini = 20 ml). Può essere dannoso per gli alcolisti.
Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o epilessia. La quantità di alcool in questo medicinale può modificare gli effetti di altri medicinali. La quantità di alcool in questo medicinale può compromettere la sua capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.
- **metile paraidrossibenzoato sodico, propile paraidrossibenzoato sodico:** possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.

La dose raccomandata **negli adulti** è 2 misurini (= 20 ml) da 1 a 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Usi nei bambini

La dose raccomandata è 1 misurino (= 10 ml) da 1 a 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Istruzioni per l'uso:



Per l'apertura del flacone: premere il tappo verso il basso svitando in senso antiorario.

Per la chiusura del flacone: avvitare il tappo fino in fondo in senso orario.

Uso del misurino: si consiglia di lavare il dispositivo ad ogni utilizzo.

Se usa più CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE **avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Con l'uso di questo medicinale si possono manifestare:

- sonnolenza, vertigini;
- disturbi gastrointestinali come nausea e vomito.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE

- I principi attivi sono potassio solfogaicolato, destrometorfano bromidrato. In 1 g di sciroppo ci sono 20 mg di potassio solfogaicolato e 1 mg di destrometorfano bromidrato.
- Gli altri componenti sono saccarosio, etanolo, sodio cloruro, metile paraidrossibenzoato sodico, glicirrinato monoammonico, aroma menta, propile paraidrossibenzoato sodico, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE e contenuto della confezione

CORYFIN SEDATIVO FLUIDIFICANTE 20 mg/g + 1 mg/g sciroppo è disponibile in una confezione contenente un flacone in vetro ambrato da 180 g con tappo a prova di bambino e misurino.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Produttore

DMS Farmaceutici S.p.A. - Via Provinciale per Lecco, 78 - 22038 Tavernerio (CO)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 22 luglio 2015